

치아 우식 진단 차트



날짜:
환자 이름:



치아 우식 유발 요인

치아 우식 예방 요인

구강 건강에 영향을 끼치는 약물 복용
정신과 처방, 설탕이 함유된 약물, 시럽 등

해당 시

타액 분비량

주관적 구강 건조증
 타액 분비량 감소로 인한 구강 건조증 (unstimulated flow rate < 0.1 ml/min)

프로빙 시 출혈(BOP)

≥ 10%
 ≥ 50%

치경부 노출

≥ 2
 ≥ 5

불소 함유 구강건조증 치료제 사용,
자일리톨 섭취, 치간 칫솔 사용 등
아르기닌 함유 치약 사용 등 요인 당 1개

설탕 섭취

≥ 일 4회
 ≥ 일 6회

최근 2년 이내 발생된 진행성 하얀 반점
병소 / 치아우식 / 수복

1개
 2개
 ≥ 3개 이상

검증되지 않은 예방법 시행

요인 당 1개 칫솔질 손동작 문제 등

TOTAL

일 1회
≥ 일 2회 이상

불소가 함유된 치약 사용

일 1회
≥ 일 2회 이상

불소 가글/
고농도 불소 치약 사용

연 1회
연 2회
≥ 일 3회 이상

GBT 혹은 치아 클리닝을 위해
치과를 방문하는 횟수

기타 전문적인 예방법 시행

▶ 치아우식 유발요인을 줄이는 방법 :

빨간색이 초록색보다 많으면 치아우식 위험군에 속하며, 치아우식 예방을 즉시 실행해해야 합니다.